Behandlungszeiten

	Gesamt 2002	Gesamt 2001		
	Anzahl	Anzahl		
Vorstationäre Behandlung (in Tagen)				
Anzahl der Patienten mit gültiger Angabe	14.831	6.734		
Median	1	1		
Präoperative Verweildauer (in Tagen)				
Anzahl der Patienten mit gültiger Angabe	149.245	77.392		
Median	1	1		
Postoperative Verweildauer (in Tagen)				
Anzahl der Patienten mit gültiger Angabe	149.257	77.395		
Median	5	5		
Nachstationäre Behandlung (in Tagen)				
Anzahl der Patienten mit gültiger Angabe	5.307	2.714		
Median	1	1		
Stationäre Aufenthaltsdauer (in Tagen)				
Anzahl der Patienten mit gültiger Angabe	149.134	77.344		
Median	7	7		
Aufenthaltsdauer inkl. vor- und				
nachstationärer Behandlung (in Tagen)				
Anzahl der Patienten mit gültiger Angabe	149.164	77.350		
Median	7	7		

© BQS 2003 - 2.2 -

Entlassungsdiagnose	Gesamt 2002			Gesamt 2001		
Bezug: Alle Fallpauschalen -Fälle mit gültiger Entlassungsdiagnose	ICD	Anzahl	%	ICD	Anzahl	%
Liste der 8 häufigsten Diagnosen						· · · · ·
Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion	K80.20	41.737	31,36%	K80.10	19.594	29,09%
Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion	K80.10	41.484	31,17%	K80.20	17.957	26,66%
Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion	K80.00	24.467	18,39%	K80.00	11.513	17,09%
Akute Cholezystitis	K81.0	4.468	3,36%	K80.1	4.155	6,17%
Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis	K80.1	3.573	2,69%	K80.2	2.928	4,35%
Gallenblasenstein ohne Cholezystitis	K80.2	2.826	2,12%	K81.0	2.337	3,47%
Chronische Cholezystitis	K81.1	2.503	1,88%	K80.0	2.057	3,05%
Gallengangsstein mit Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion	K80.40	1.962	1,47%	K81.1	1.708	2,54%

© BQS 2003 - 2.3 -

Entlassungsdiagnose	Gesamt 2002			Gesamt 2001		
Bezug: Alle Sonderentgelt -Fälle mit gültiger Entlassungsdiagnose	ICD	Anzahl	%	ICD	Anzahl	%
Liste der 8 häufigsten Diagnosen						
Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion	K80.10	800	10,29%	K80.10	351	9,40%
Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion	K80.00	694	8,92%	K85	300	8,03%
Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion	K80.20	693	8,91%	K80.00	284	7,61%
Akute Pankreatitis	K85	581	7,47%	K80.20	269	7,20%
Akute Cholezystitis	K81.0	297	3,82%	K80.1	185	4,95%
Perforation der Gallenblase	K82.2	239	3,07%	K80.0	140	3,75%
Bösartige Neubildung der Gallenblase	C23	228	2,93%	K81.0	125	3,35%
Gallengangsstein mit Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion	K80.41	147	1,89%	K80.2	122	3,27%

© BQS 2003 - 2.4 -