



Qualitätsmerkmal: Indikation 1**Qualitätsziel:** Notwendige Operationen mit typischer Symptomatik

Grundgesamtheit: Gruppe I: Akute Patienten (FP 12.01, 12.02)
 Gruppe II: Elektive Patienten (FP 12.03, 12.04)
 Gruppe III: Patienten ohne Angabe der Dringlichkeit (SE 12.10, 12.12)
 Gruppe IV: Alle Patienten

	Gesamt 2002			
	Gruppe I akut	Gruppe II elektiv	Gruppe III o. Ang.	Gruppe IV alle Pat.
Patienten in der Gruppe	37.057	102.362	8.417	149.257
davon:				
Patienten mit rezidiv. Koliken und sicherem Gallensteinnachweis	25.847 69,75%	76.305 74,54%	4.187 49,74%	107.368 71,93%
Patienten mit uncharakt. Schmerzen im rechten Oberbauch und sicherem Gallensteinnachweis und zusätzlicher Umgebungsdiagnostik (endoskopisch oder radiologisch)	11.435 30,86%	32.567 31,82%	3.101 36,84%	47.519 31,84%
Patienten mit sicherem Gallenstein- nachweis und extrahepatischer Cholestase	4.377 11,81%	5.435 5,31%	1.752 20,82%	11.783 7,89%
Patienten mit Cholestase, anamnestisch und sicherem Gallensteinnachweis u. zusätzlicher Umgebungsdiagnostik (endoskopisch oder radiologisch)	3.553 9,59%	5.794 5,66%	1.579 18,76%	11.129 7,46%
Patienten mit akuten Entzündungs- zeichen und klinischem Befund und (Leukozyten oder Temperatur oder Sonographie)	24.711 66,68%	8.405 8,21%	3.409 40,50%	36.887 24,71%
Alle Patienten mit ausreichender Indikation	34.886 94,14%	87.495 85,48%	6.676 79,32%	130.298 87,30%
Vertrauensbereich Referenzbereich				87,13% - 87,47% > x %

Verteilung der Krankenhausergebnisse [Diagr. 2]:
Anteil Patienten mit ausreichender Indikation von allen Patienten
 Minimum - Maximum der Krankenhauswerte: 34,8% - 100,0%
 Median - Mittelwert der Krankenhauswerte: 89,6% - 87,5%



1142 Krankenhäuser haben mindestens 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit.